

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 24-59 BULAN DI DESA MALINAU HILIR KABUPATEN MALINAU

Gita Ekawati

Abstrak

Stunting adalah suatu keadaan terhambatnya pertumbuhan yang bersifat kronis disebabkan malnutrisi dalam jangka panjang. Penyebab stunting bersifat multifaktorial dan tidak hanya dipengaruhi oleh gizi buruk yang dialami ibu saat hamil dan balita, salah satu faktor penyebab stunting adalah Praktik Pengasuhan Ibu yang Kurang Baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pola pemberian makan ibu, kebersihan, pencarian pelayanan kesehatan dan stimulasi psikososial dengan kejadian stunting pada balita. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga didapatkan sampel 109 responden. Responden penelitian adalah ibu yang memiliki balita usia 24-59 bulan di Desa Malinau Hilir Kabupaten Malinau. Instrumen yang digunakan adalah data primer dengan mengukur Tinggi Badan Balita menggunakan microtoise dan Kuesioner. Analisa data yang digunakan yaitu uji statistik bivariat dengan Uji *Chi-Square*. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pola pemberian makan ($p=0,002$), pola kebersihan ($p=0,001$), pola pencarian pelayanan kesehatan ($p=0,000$) dan pola stimulasi psikososial ($p=0,004$) dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan di Desa Malinau Hilir Kabupaten Malinau. Kesimpulan penelitian adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita meliputi pola pemberian makan, pola kebersihan, pola pencarian pelayanan kesehatan dan pola stimulasi psikososial.

Kata Kunci : Stunting, Pola Pemberian Makan, Pola Kebersihan, Pola Pencarian Pelayanan Kesehatan, Pola Stimulasi Psikososial

THE RELATION OF FACTORS OCCURRENCE OF STUNTING IN TODDLERS AGED 24-59 MONTHS IN THE MALINAU HILIR VILLEGE, MALINAU REGENCY

Gita Ekawati

Abstrac

Stunting is a condition of delayed growth that is severe due to malnutrition in the long term. The causes of stunting are multifactorial and are not only influenced by inadequate nutrition during pregnancy and toddlers, one of the factors causing stunting is bad parenting from mother. The purpose of the study was to analyze the relation between feeding, hygiene, use of health facilities and psychosocial stimulation with toddler stunting. This study used a cross sectional design. The technique used in determining the sample is a purposive sampling and the results obtained 109 respondents. The study used mothers who had toddlers aged 24-59 months in Malinau Hilir Village, Malinau Regency. The instrument used is primary data by measuring the toddler's height using microtoise and questionnaires. Analysis of the data used is bivariate statistical test with Chi-Square Test. This study has the result that there is a relation between feeding ($p = 0.002$), hygiene ($p = 0.001$), use of health facilities ($p = 0.000$) and psychosocial stimulation ($p = 0.004$) with the stunting in toddlers aged 24 -59 months in Malinau Hilir Village, Malinau Regency. The conclusion of the study is that the factors related to the stunting in toddlers include feeding, hygiene, use of health facilities and psychosocial stimulation

Keyword : Stunting, Feeding, Hygiene, use of health facilities, psychosocial stimulation