

HUBUNGAN ANTARA FAKTOR PREDISPOSISI MATERNAL TERHADAP KEMUNGKINAN TIMBULNYA PREEKLAMSIA DI RS.SALAK BOGOR PERIODE TAHUN 2014-2015

Muhammad Rifo jafriadi

Abstrak

Preeklamsia merupakan suatu sindroma spesifik pada kehamilan yang dapat menyebabkan gangguan pada berbagai organ. Preeklamsia merupakan penyebab kematian nomor tiga pada bidang obstetrik dan ginekologi. Penyakit ini merupakan penyakit multifaktorial yang terdiri atas faktor genetik dan faktor predisposisi maternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara faktor predisposisi maternal terhadap kemungkinan timbulnya preeklamsia. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain *cross-sectional* dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2016 di Poli Kandungan Rumah Sakit Salak Bogor. Subjek pada penelitian ini adalah pasien ibu hamil yang memiliki data rekam medis lengkap, terdiagnosa preeklamsia, dan tidak memiliki riwayat preeklamsia sebelumnya. Data diperoleh dari rekam medis. Pengambilan data menggunakan metode *simple random sampling*. Besar sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 128 orang. Hasil uji *chi-square* didapatkan bahwa terdapat hubungan antara faktor predisposisi maternal terhadap kemungkinan timbulnya preeklamsia ($P<0,05$) . Hasil analisis multivariat didapatkan probabilitas pasien yang memiliki faktor predisposisi maternal mengalami preeklamsia sebesar 94,8%.

Kata kunci : preeklamsia, faktor predisposisi maternal, ibu hamil.

Kepustakaan : 28 (2010-2015)

**THE RELATIONSHIP BETWEEN PREDISPOSING FACTORS
OF MOTHERS AGAINST POSSIBLE INCIDENCE OF
PREECLAMPSIA AT SALAK BOGOR HOSPITAL PERIOD
2014-2015**

Muhammad Rifo Jafriadi

ABSTRACT

Preeclampsia is a specific pregnancy syndrome which can cause disturbances in various organs. Preeclampsia is the third leading cause of death in the obstetrics and gynecology. This disease is a multifactorial disease that consists of predisposing factors and genetic factors of maternal. The aims of this study is to determine whether there is a relationship between maternal predisposing factor to the possibility of the onset of preeclampsia. This study is a cross sectional analytic design are carried out in February-March 2016 at Departement of Obstetric and Gynecology Salak Bogor Hospital. Subject in this study were patients with criteria : pregnant women who had a complete medical record, and undiagnosed preeclampsia, and don't have previous preeclampsia history. Data were obtained from medical record. Retrieval of data using simple random sampling methods. Chi-Square of this study showed that there is a relationship between the predisposing factors to possible incidence of preeclampsia ($p<0,05$). Multivariate analysis showed that probability of patient who had predisposing factors to have preeclampsia is 94,8%

Keyword : preeclampsia, predisposing factors of maternal, pregnant women

Bibliography : 28 (2010-2015)