

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan derajat penyakit osteoarthritis lutut, didapatkan distribusi frekuensi terbanyak terdapat pada kelompok derajat OA ringan dibandingkan dengan derajat OA berat.
- b. Berdasarkan nilai NLR, ditemukan distribusi frekuensi terbanyak pada kelompok NLR dengan *cut off* ( $< 2,1$ ) dibandingkan dengan kelompok NLR dengan *cut off* ( $> 2,1$ ).
- c. Berdasarkan hasil uji *Chi-Square* dapat disimpulkan yaitu terdapat hubungan yang signifikan atau bermakna antara derajat penyakit osteoarthritis lutut dengan *Neutrophil Lymphocyte Ratio* (NLR) pada pasien di RSUD Al Fauzan Jakarta periode 2019-2021

#### V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut baik dari segi metode yang lebih spesifik maupun jumlah sampel yang lebih banyak, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang belum diteliti pada penelitian ini.