

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

- a. Anak usia 0-12 bulan yang diberikan ASI lebih banyak dibandingkan dengan anak yang tidak diberikan ASI yaitu 62 (70.5%) anak.
- b. Terdapat hubungan bermakna antara pemberian susu formula dan pemberian ASI dengan kejadian diare pada anak usia 0-12 bulan, dengan hasil pemberian susu formula lebih meningkatkan risiko terjadinya diare dibandingkan dengan pemberian ASI pada anak usia 0-12 bulan.

V.2. Saran

- a. Bagi masyarakat luas terutama ibu yang memiliki anak usia 0-12 bulan diharapkan saat memberikan ASI maka mencuci tangan, lalu payudara dibersihkan dengan air hangat terlebih dahulu dan jika memberikan susu formula, maka botol susu agar dibersihkan dengan cara direbus dengan air mendidih selama 10 menit sehingga bayi ibu dapat terhindar dari penyakit diare.
- b. Bagi praktisi kesehatan diharapkan agar memberikan arahan kepada orangtua pasien mengenai langkah-langkah pencegahan serta pengobatan terhadap penyakit diare.
- c. Bagi peneliti lain perlu penelitian lebih lanjut pada faktor lain penyebab diare, seperti faktor alergi dan faktor higienitas, agar kejadian diare terutama pada anak usia 0-12 bulan dapat diturunkan.