

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. 43,4% responden, yang pernah menderita akne vulgaris, memiliki kadar hemoglobin yang kurang dari nilai normal.
- b. 60,3% responden penelitian ini memiliki skar akne.
- c. Tidak ada hubungan yang bermakna antara kadar hemoglobin dengan kejadian skar akne pada mahasiswa FK UPN “Veteran” Jakarta tahun 2019.

V.2. Saran

V.2.1. Bagi Responden

- a. Responden diharapkan mencari informasi dari media promotif di pelayanan kesehatan mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan anemia sehingga dapat mengurangi angka kesakitan serta risiko penyakit lain yang dapat diakibatkan oleh kondisi anemia.
- b. Responden diharapkan mencari informasi dan berkonsultasi mengenai penyakit akne vulgaris dan faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan skar akne sehingga dapat mengurangi angka kesakitan, serta menghindari dampak psikososial yang ditimbulkan.

V.2.2. Masyarakat Umum

- a. Masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi faktor perilaku yang dapat menyebabkan skar akne.

V.2.3. Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode *cohort* serta jumlah sampel yang lebih

banyak dan lebih mengendalikan faktor-faktor perancu yang dapat mempengaruhi kejadian skar akne.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini yang dapat mempengaruhi kejadian skar akne.

