

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Tingkat keparahan flebitis yang ditemukan pada pasien kelolaan utama maupun resume ialah skala 2, yang ditandai dengan adanya kemerahan, bengkak dan nyeri disekitar area penusukan.
- b. Kompres hangat efektif untuk menurunkan skala flebitis atau mengurangi tanda gejala flebitis. Pada pasien kelolaan utama yang diberikan intervensi kompres hangat, dari tingkatan skala 2 turun menjadi 0. Sedangkan pasien resume yang tidak diberi inovasi intervensi kompres hangat mengalami penurunan tingkatan skala flebitis yang lambat.
- c. Terapi inovasi intervensi ini dapat diberikan selama 10-15 menit dan dapat dilakukan hingga 3x dengan suhu panas berkisar antara 37°C – 40°C.

VI.2 Saran

VI.2.1 Bagi Pelayanan

Disarankan agar Teknik kompres hangat dapat diterapkan oleh tenaga kesehatan lainnya dalam mengurangi derajat flebitis pada pasien di rumah sakit.

VI.2.2 Bagi Ilmu Keperawatan

Disarankan untuk mengembangkan terapi nonfarmakologi salah satunya yaitu kompres hangat pada pasien flebitis.