

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Responden paling banyak pada penelitian ini pada rentang usia 70-79 tahun (12 pasien).
2. Pasien BPH di RSPAD Gatot Soebroto yang sebelum menjalani prosedur TURP memiliki rata-rata skor BII sebesar 10,44
3. Pasien BPH di RSPAD Gatot Soebroto sesudah menjalani prosedur TURP memiliki rata-rata skor BII sebesar 1,15
4. Ada perbaikan kualitas hidup pasien BPH sesudah menjalani prosedur TURP di RSPAD Gatot Soebroto tahun 2017.

V.2 Saran

V.2.1 Bagi Rumah Sakit

1. Diharapkan untuk RSPAD (dalam hal ini tim urologi) dapat melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan metodologi penelitian yang lebih baik dan dengan jumlah sampel yang lebih banyak, dengan memperhitungkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kualitas hidup pasien

V.2.2 Bagi Peneliti Lain

1. Melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metodologi penelitian prospektif dalam mendapatkan data penelitian yang lebih akurat
2. Perlunya dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi skor BII pasca TURP, seperti faktor penyakit penyerta, komplikasi pasca TURP, dsb