

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Rumusan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian diatas adalah sebagai berikut :

- a. Subjek penelitian memiliki rata-rata usia 45 tahun dan mayoritas subjek pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan.
- b. Rata-rata lama rawat inap pasien COVID-19 di RSUD R Syamsudin SH Sukabumi yang menerima terapi favipiravir lebih singkat yaitu 7.33 hari dibandingkan pasien yang menerima remdesivir yaitu 9.29 hari.
- c. Terdapat perbedaan lama rawat inap antara pemberian remdesivir dan favipiravir pada pasien COVID-19 di RSUD R Syamsudin SH Sukabumi.

V.2 Saran

1. Bagi RSUD R Syamsudin SH Sukabumi

Berdasarkan penelitian ini favipiravir lebih efektif dibandingkan remdesivir dalam menurunkan lama rawat inap pasien COVID-19, sehingga dapat dipilih pemberian terapi favipiravir pada pasien yang sesuai dengan kriteria penelitian ini untuk menurunkan lama rawat inap pasien COVID-19.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan analisis antara pemberian antivirus terhadap lama rawat inap pasien COVID-19 yang disertai penyakit penyerta sehingga dapat mengembangkan penelitian ini.
- b. Peneliti selanjutnya disarankan mengetahui perbandingan antara pemberian antivirus terhadap lama rawat inap pasien COVID-19 dengan derajat keparahan ringan/sedang.