

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan merujuk pada tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Demografi pasien SI dengan COVID-19 paling banyak adalah laki-laki sebanyak 71 kasus (66,4%) dengan rentang usia 55-65 tahun sebanyak 49 kasus (45,8%).
2. Prevalensi SI dengan COVID-19 di RS PON tahun 2021 sebesar 6,5% (n=283) dari total 4363 pasien stroke iskemik. Insiden SI dengan COVID-19 dilaporkan terbanyak pada bulan Januari dengan 31 kasus (29%).
3. Karakteristik lesi infark pasien SI dengan COVID-19 paling sering merupakan infark kronik sebanyak 72 kasus (47,3%).
4. Lokasi lesi infark pasien SI dengan COVID-19 di RS PON tahun 2021 terbanyak adalah corona radiata pada 36 kasus (12,1%), dengan predileksi berdasarkan hemisfer terbanyak pada hemisfer bilateral sebesar 66 kasus (61,7%). Lesi infark pada teritori MCA merupakan lokasi paling sering mengalami oklusi baik sebelum maupun selama pandemi COVID-19.

V.2. Saran

1. Perlu dilakukan pembaruan *guideline* serta pelatihan pengisian rekam medis bagi RS PON untuk menghindari bias dan ketidaklengkapan data rekam medis.
2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap rekam medis dengan kesalahan penulisan kode diagnosis untuk menghindari misinformasi dalam penelitian selanjutnya.