

BAB VI

KESIMPULAN

Bronkiolitis adalah infeksi saluran pernapasan bawah pada bayi yang paling umum. Hampir semua anak-anak telah terpapar virus pernapasan (RSV), penyebab kebanyakan kasus bronkiolitis, di dua tahun pertama setelah kelahiran. Hingga 3% dari semua anak-anak di rumah sakit menderita bronkiolitis di tahun pertama

RSV adalah virus yang menyebabkan terjadinya infeksi pada paru dan saluran napas. Sekitar 50% bronkiolitis akut disebabkan oleh RSV. Virus ini sering sekali menyerang anak-anak, biasanya seorang anak yang berusia 2 tahun sudah pernah terinfeksi oleh virus ini. RSV juga dapat menginfeksi orang dewasa.

Diagnosis banding Bronkiolitis harus dibedakan dengan asma pada anak usia di bawah 2 tahun. Kecurigaan bronkiolitis apabila kejadian sesak merupakan pertama kali sedangkan pada asma selain tanpa disertai demam kejadian seperti ini merupakan kejadian yang berulang. Selain asma, pneumonia karena bakteri pun kadang-kadang sulit dibedakan apabila disertai dengan sumbatan respiratorik karena kaliber saluran yang masih kecil.

Intervensi yang dilakukan sebanyak 10 kali telah memberikan hasil menurunnya meningkatnya higienis jalan nafas, mengurangi sesak dan meningkatkan ekspansi thorak. Terapi diberikan sesuai dosis yang tertera pada jurnal dan memberikan hasil yang optimal.