

GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BAYI LAHIR PREMATUR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU

Dwi Setiyorini

Abstrak

Persalinan prematur adalah persalinan pada umur kehamilan kurang dari 37 minggu atau berat badan lahir antara 500-2499 gram. faktor yang mempengaruhi kelahiran prematur mencakup faktor ibu dan faktor kehamilannya itu sendiri. Faktor ibu yaitu : Malnutrisi, usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, penyakit jantung, ginjal atau diabetes, riwayat kelahiran prematur sebelumnya. Sedangkan dari faktor kehamilan meliputi : Hipertensi kehamilan, penurunan fungsi plasenta atau plasenta abnormal, solusio plasenta atau plasenta previa, ketuban pecah dini. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis faktor penyebab bayi lahir prematur di Rumah Sakit Pasar Minggu. Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah kohort retrospektif dengan jumlah sample sebanyak 35 responden. Hasil dari analisa data univariat menunjukkan bahwa, Responden dengan masalah kesehatan Ketuban pecah dini memiliki hasil terbanyak yaitu 31 responden (88,6%). Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai faktor penyebab kelahiran bayi prematur yang sebagian besar disebabkan oleh Ketuban pecah dini.

Kata kunci : Faktor Kehamilan, KPD, Pengetahuan, Prsalinan Prematur

DESCRIPTION OF THE FACTORS CAUSING THE PREMATURE OF BORN BABIES IN THE GENERAL LOCAL HOSPITAL OF THE MARKET

Dwi Setiyorini

Abstrak

Premature labor is labor at a gestational age of less than 37 weeks or birth weight between 500-2499 grams. factors that affect premature birth include maternal factors and the factor of pregnancy itself. Maternal factors, namely: Malnutrition, age less than 20 years or more than 35 years, heart disease, kidney or diabetes, previous history of preterm birth. While from pregnancy factors include: Pregnancy hypertension, decreased placental function or abnormal placenta, placental abruption or placenta previa, premature rupture of the membranes. This study aims to analyze the factors that cause babies born prematurely at Pasar Minggu Hospital. The study design used by the researcher was a retrospective cohort with a total sample of 35 respondents. The results of univariate data analysis showed that respondents with early ruptured amniotic health problems had the highest results, namely 31 respondents (88.6%). This study is expected to provide knowledge about the factors that cause premature births which are mostly caused by premature rupture of membranes.

Keywords : Factor of Pregnancy, KPD, Knowledge, Prematur Labor