

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah didapatkan dan dipaparkan sebelumnya, dapat dilakukan penarikan kesimpulan yaitu antara lain:

1. Karakteristik responden berdasarkan usia, pasien lanjut usia paling banyak dengan persentase sebesar 80%, berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan paling banyak dengan persentase sebesar 66,7%, berdasarkan status pendidikan, kategori SMA paling banyak dengan persentase 66,7%, berdasarkan status keaktifan bekerja, responden aktif bekerja paling banyak dengan persentase sebesar 53,3%, berdasarkan obat antihipertensi yang didapatkan dari puskesmas, amlodipin dosis 10 mg paling banyak diberikan kepada pasien sebesar 64,5%
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian informasi obat dengan pengetahuan pasien ($p < 0,05$)
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian informasi obat dengan kepatuhan pasien ($p < 0,05$)

V.2 Saran

Saran ini dapat menjadi solusi. Perlu dilakukannya penelitian yang membahas faktor lain yaitu faktor pemungkin dan faktor penguat yang dapat memengaruhi hasil penelitian, sehingga menghasilkan hasil penelitian dari sudut yang berbeda. Pada penelitian ini, pasien sebaiknya melakukan konfirmasi ulang mengenai bungkus obat antihipertensi, sehingga kesesuaian antara bungkus obat dan jawaban pada kuesioner dapat diamati. Pada penelitian ini perlu dilakukannya pengumpulan data tekanan darah pasien sebelum dan sesudah edukasi dan minum obat antihipertensi sebagai informasi tambahan untuk memantau kondisi tekanan darah pasien.