

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah pasien pada pasien skizofrenia komorbid DM Tipe 2 dengan rejimen terapi antidiabetes dan antipsikotik di RSJMM periode 2022-2023 adalah 21 orang.
2. Tidak ditemukan adanya pasien dengan DRPs kategori ROTD pada pasien skizofrenia komorbid DM Tipe 2 dengan rejimen terapi antidiabetes dan antipsikotik di RSJMM periode 2022-2023
3. Presentase DRPs kategori interaksi obat aktual adalah sebesar 61,9% dari 21 pasien dan presentase DRPs kategori interaksi obat potensial adalah sebesar 71,4 % dari 21 pasien.
4. Tidak terdapat hubungan Interaksi obat aktual pada pasien skizofrenia komorbid DM tipe 2 dengan kadar glukosa darah (nilai  $p > 0,505$ ).
5. Tidak terdapat hubungan Interaksi obat aktual dan ROTD pada pasien skizofrenia komorbid DM tipe 2 dengan LOS (nilai  $p > 0,359$ ).

#### **V.2 Saran**

Beberapa rekomendasi yang dibuat oleh penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan:

1. Perlu dilakukan penelitian pengaruh DRPs terhadap perubahan kadar glukosa darah dan LOS lebih lanjut pada pasien skizofrenia komorbid DM Tipe 2 dan skizofrenia komorbid DM tipe 2 dengan desain penelitian prospektif mengenai penggunaan obat antidiabetes dan antipsikotik pada pasien.
2. Perlu adanya peningkatan jumlah sampel untuk memperoleh gambaran yang lebih mendetail mengenai keadaan tersebut.