

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Distribusi karakteristik pasien yang terdeteksi PAP di Puskesmas Rangkapan Jaya Baru Kota Depok tahun 2024 berdasarkan hasil interpretasi pemeriksaan ABI (kalsifikasi, normal, dan PAP), sebagian besar ditemukan pada wanita dibandingkan pria. Sementara itu, pasien yang terdeteksi PAP paling banyak memiliki faktor risiko hipertensi dan IMT kategori *underweight*. Sedangkan, mayoritas pasien yang terdeteksi PAP tidak mengalami DM dan hipertrigliserida.
2. Tidak adanya perbedaan kejadian penyakit arteri perifer berdasarkan pemeriksaan *ankle-brachial index* terhadap jenis kelamin.
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna dan signifikan secara statistik antara faktor risiko hipertensi, diabetes melitus, hipertrigliserida, dan IMT terhadap kejadian PAP.
4. Pada penelitian ini, prediktor dari kejadian penyakit arteri perifer tidak dapat ditemukan. Hal ini dikarenakan seluruh variabel yang tersaji pada penelitian ini tidak didapatkan hubungan terhadap kejadian penyakit arteri perifer.

## 5.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi kejadian PAP selain dari jenis kelamin, hipertensi, diabetes melitus, hipertrigliserida, dan IMT.
2. Perlu dilakukan studi longitudinal dengan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga dapat mewakili seluruh populasi.