

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang disimpulkan, yaitu:

- a. Terdapat 10 pasien epidural hematoma anak yang mengalami kasus mortalitas dari total 59 pasien.
- b. Tidak terdapat hubungan antara usia dengan kejadian mortalitas pada pasien epidural hematoma anak.
- c. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian mortalitas pada pasien EDH anak.
- d. Tidak terdapat hubungan antara penyebab EDH dengan kejadian mortalitas pada pasien EDH anak.
- e. Tidak terdapat hubungan antara tindakan operatif dengan kejadian mortalitas pada pasien EDH anak.
- f. Terdapat hubungan antara trauma hemoragik ekstrakranial dengan kejadian mortalitas pada pasien EDH anak.
- g. Tidak terdapat hubungan antara fraktur kranial dengan kejadian mortalitas pada pasien EDH anak.
- h. Tidak terdapat hubungan antara Lokasi EDH dengan kejadian mortalitas pada pasien EDH anak.
- i. Terdapat hubungan antara *midline shift* dengan kejadian mortalitas pada pasien EDH anak.

- j. Terdapat hubungan antara skor GCS dengan kejadian mortalitas pada pasien EDH anak
- k. Terdapat hubungan antara kadar hemoglobin dengan kejadian mortalitas pada pasien EDH anak.
- l. Tidak terdapat hubungan antara denyut nadi dengan kejadian mortalitas pada pasien EDH anak.
- m. Tidak terdapat hubungan antara tekanan darah sistolik dengan kejadian mortalitas pada pasien EDH anak.

V.2 Saran

V.2.1 Saran untuk Peneliti

Peneliti dapat melakukan penelusuran lebih lanjut pada faktor-faktor risiko lainnya yang belum tercantum dalam penelitian ini yang mungkin memiliki hubungan dengan kejadian mortalitas pasien epidural hematoma.

V.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan dasar referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan lebih komperhensif dan mengambil data dengan sampel yang lebih banyak serta cakupannya lebih luas. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk faktor-faktor yang belum dicantumkan pada penelitian ini. Serta peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini untuk menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian mortalitas pasien epidural hematoma.

V.2.3 Saran untuk FK UPN “Veteran” Jakarta

Penelitian ini dapat menjadi sumber kepustakaan tentang ada tidaknya hubungan faktor risiko dengan kejadian mortalitas pada pasien epidural hematoma usia 0-19 tahun. Penelitian ini dapat dijadikan acuan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneruskan topik yang sama.

V.2.3 Saran untuk Rumah Sakit Ananda Bekasi dan RSUD Kabupaten Bekasi

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan dasar utama untuk mengembangkan fokus manajemen rumah sakit terhadap penyakit emergensi lainnya. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan edukasi , sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Serta diharapkan sistem perngarsipan atau penyimpanan data rekam medis berbasis elektronik yang sedang berjalan bisa meningkatkan kelengkapan dan kesistematiskan data pasien.