

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY.S DENGAN RUPTUR
PERINEUM DERAJAT II DI KLINIK KEBIDANAN KUSNIAH
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR**

Latifah Rahmah Andini

Abstrak

Latar Belakang : Ruptur perineum grade II adalah bentuk komplikasi cedera local pada organ antara lubang vagina dan lubang rektal yang dapat terjadi pada ibu dengan kelahiran anak pertama saat melahirkan normal, dapat terjadi akibat robekan alami, tindakan insisi, atau keduanya. Robekan perineum menimbulkan nyeri hebat. Penelitian ini diterapkan guna menelaah pelaksanaan asuhan keperawatan pada Ny.S dengan ruptur perineum derajat II melibatkan analisis, penentuan diagnosis, tindakan, pelaksanaan, serta penilaian ulang dalam praktik keperawatan.

Metode Penelitian : Pendekatan yang diaplikasikan pada penelitian ini bersifat deskriptif dengan memakai metode studi kasus. **Hasil Penelitian:** Permasalahan keperawatan yang ditemukan pada kasus adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, dan risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam dengan memberikan latihan non-farmakologis anti-nyeri, latihan gerak aktif Range Of Motion (ROM), dan perawatan vulva hygiene selama 20 menit sehari hasil analisis masalah keperawatan teratasi sebagian dengan tujuan dan kriteria hasil yang ditetapkan. **Kesimpulan :** pelaksanaan asuhan keperawatan pada Ny. S dengan rupture perineum derajat II memenuhi hasil yang diinginkan karena didukung hubungan teraupetik yang baik antara perawat dan pasien serta tim kesehatan lainnya.

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan, Nyeri Akut, Ruptur Perineum

NURSING CARE IN NY.S WITH RUPTURE PERINEAL GRADE II IN THE KHUSNIAH'S OBSTETRIC CLINIC, TAJURHALANG DISTRICT, BOGOR CITY

Latifah Rahmah Andini

Abstract

Background : Rupture perineal grade II is a mother which giving birth the baby at the first time with rupture perineal's organ caused by natural lacerated, incision procedure, or both. The rupture will be creating severe pain. This observation was conducted to examine the application of nursing care to Mrs. S with rupture perineal grade II includes nursing assessment, nursing diagnosis, nursing intervention, nursing implementation, and nursing evaluation. **Research Methods :** a descriptive design was employed utilizing a case study approach. **Research Results :** Identified nursing issues in this case included acute pain associated with physical injury, limited mobility due to pain, and an increased risk of infection linked to invasive procedures. After administering nursing interventions for 72 hours by providing non-pharmacological anti-pain exercises, active range of motion (ROM) exercise, and vulva hygiene exercise for 20 minutes a day, the results of the nursing evaluation were partially resolved with the objectives and outcome criteria set.

Conclusion : Practice of nursing care to Ny. S with rupture perineal grade II reaching the wishes result because there is a good therapeutic relationship between nurses and patients and other health teams

Keywords : Nursing Care, Severe Pain, Rupture Perineal