

ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY.F (P3A0) POST SECTIO CAESAREA ATAS INDIKASI PREEKLAMPSIA BERAT DI RSUD PASAR REBO JAKARTA TIMUR

Yenni Diana Puspita

Abstrak

Latar Belakang: Sebagian besar, prosedur penyelamatan termasuk sectio caesarea jika kehamilan Anda mengalami komplikasi, seperti preeklampsia berat, yang berpotensi menyebabkan kematian ibu. Perawatan yang tepat diperlukan untuk preeklampsia, yang merupakan penyebab kematian ibu terbanyak kedua di Indonesia. Ini terutama berlaku untuk ibu yang telah menjalani operasi persalinan (SC). **Tujuan:** Penelitian ini berguna untuk memberikan asuhan keperawatan kepada Ny.F post sectio caesarea atas indikasi preeklampsia berat di RSUD Pasar Rebo. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif sederhana dengan pendekatan studi kasus serta analisis data kualitatif dan kuantitatif. **Hasil:** Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama tiga hari terhadap Ny. F (P3A0) ditemukan lima diagnosa keperawatan yaitu perfusi perifer tidak efektif, nyeri akut, gangguan mobilitas fisik, gangguan integritas jaringan, dan menyusui tidak efektif. Intervensi keperawatan dilakukan sesuai dengan SLKI dan SIKI, dan hasil evaluasi menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasien pada masing-masing diagnosa keperawatan. **Kesimpulan:** Asuhan keperawatan pada Ny. F (P3A0) post sectio caesarea dengan indikasi preeklampsia berat menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasien setelah dilakukan intervensi keperawatan yang tepat berdasarkan diagnosa keperawatan yang ditemukan. Pendekatan proses keperawatan yang sistematis efektif dalam membantu pemulihan pasien.

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan, Preeklampsia Berat, Sectio Caesarea

NURSING CARE FOR NY.F (P3A0) POST CESAREAN SECTION DUE TO SEVERE PREECLAMPSIA AT PASAR REBO GENERAL HOSPITAL, EAST JAKARTA

Yenni Diana Puspita

Abstract

Background: Cesarean section is often chosen as a life-saving measure in pregnancies with complications, one of which is severe preeclampsia. This condition can lead to serious complications and even maternal death. Preeclampsia is the second leading cause of maternal mortality in Indonesia, thus requiring appropriate nursing care, especially for mothers post-cesarean section. **Objective:** This study aims to provide nursing care for Mrs. F post-cesarean section due to severe preeclampsia at Pasar Rebo General Hospital. **Method:** This study used a simple descriptive design with a case study approach and qualitative and quantitative data analysis. **Results:** After three days of nursing care for Mrs. F (P3A0), five nursing diagnoses were identified: ineffective peripheral perfusion, acute pain, impaired physical mobility, impaired tissue integrity, and ineffective breastfeeding. Nursing interventions were carried out based on SLKI and SIKI, and the evaluation showed improvements in the patient's condition for each nursing diagnosis. **Conclusion:** The nursing care provided to Mrs. F (P3A0) post-cesarean section due to severe preeclampsia showed clinical improvement following appropriate interventions based on the identified nursing diagnoses. A systematic nursing process approach proved effective in supporting the patient's recovery.

Keywords: Nursing Care, Severe Preeclampsia, Cesarean Section