

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang berjudul Efektivitas Analgesik Opioid dan Kesesuaian Profil Terapi dengan WHO *Analgesic Ladder* Pada Pasien Kanker Payudara di Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta Tahun 2023, dapat dilakukan penarikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik pasien didominasi oleh pasien usia 44-59 tahun (pra-lansia) sebesar 41,38%; dengan stadium IV kanker payudara sebesar 70,69%; memiliki penyakit penyerta hipertensi sebesar 38,89%; melaporkan nyeri dengan skala 2 sebesar 43,10%; dan menunjukkan intensitas nyeri berupa nyeri ringan (Skala 1-3) sebesar 75,86%.
2. Penggunaan analgesik opioid terbanyak adalah jenis morfin sebesar 62,07% dengan regimen dosis morfin peroral dosis 10-30 mg sebesar 34,48%.
3. Analgesik opioid pada pasien kanker payudara yang mengalami nyeri kanker terbukti efektif ($p < 0,001$) dan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari penurunan skala nyeri sebelum dan sesudah diberikan terapi analgesik opioid.
4. Penggunaan analgesik opioid pada pasien kanker payudara yang mengalami nyeri kanker hanya 15,51% yang sesuai dengan pedoman WHO *Analgesic Ladder*.

V.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, saran yang dapat dijadikan solusi yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian yang membahas efektivitas analgesik opioid berdasarkan lokasi dan jenis nyeri yang

dirasakan pasien, agar menghasilkan hasil dan pembahasan penelitian dari sudut pandang yang berbeda.

2. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian secara prospektif agar dapat memperluas sumber data yang akan digunakan.