

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Responden yang paling banyak menggunakan IUD yaitu perempuan yang berusia > 35 tahun
- b. Responden yang paling banyak menggunakan IUD adalah responden dengan tingkat pendidikan lanjut yaitu 73,7%
- c. Responden yang paling banyak menggunakan IUD adalah responden yang mendapatkan dukungan baik dari suami 58,3%
- d. Responden yang paling banyak menggunakan IUD adalah responden yang mendapatkan dukungan baik dari tenaga kesehatan 70,6%
- e. Responden yang paling banyak menggunakan IUD adalah responden dengan pengetahuan baik 82,4%
- f. Ada hubungan yang bermakna antara usia dengan penggunaan IUD
- g. Ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan penggunaan IUD
- h. Ada hubungan yang bermakna antara dukungan suami dengan penggunaan IUD
- i. Ada hubungan yang bermakna antara dukungan tenaga kesehatan dengan penggunaan IUD
- j. Ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan penggunaan IUD

V.2 SARAN

V.2.1 Bagi Puskesmas Limo

- a. Melakukan pendekatan dan pemberian konseling kepada aseptor yang berusia (<35 tahun) dengan latar belakang pendidikan rendah. Guna menyamakan pikiran dan memberikan informasi secara lebih detail

mengenai pentingnya penggunaan kontrasepsi, efek samping serta manfaat kontrasepsi IUD.

- b. Meningkatkan pemberian edukasi kepada masyarakat melalui media massa seperti pemasangan poster KB di lingkungan Puskesmas dan rumah warga.
- c. Diharapkan aseptor yang ingin melakukan pemasangan KB untuk membawa suami mereka, sehingga petugas kesehatan dapat mendiskusikan mengenai jenis KB yang akan digunakan

V.2.2 Bagi peneliti selanjutnya

- a. Bagi peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang belum diteliti seperti agama, jumlah anak, pendapatan dan jarak tempat pelayanan.
- b. Bagi penelitian lain disarankan untuk melakukan analisis lebih lanjut atau melakukan uji multivariat sehingga dapat mengetahui faktor paling dominan yang mempengaruhi penggunaan IUD.
- c. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel penelitian, supaya lebih menggambarkan populasi yang sebenarnya.
- d. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar lebih rinci dalam meneliti variabel tenaga kesehatan, sehingga dapat diketahui apakah bidan, dokter atau kader yang berhubungan dengan penggunaan IUD