

**PERBANDINGAN EFEKTIVITAS ANTIPSIKOTIK TERAPI
TUNGGAL RISPERIDON DENGAN TERAPI KOMBINASI
HALOPERIDOL DAN KLORPROMAZIN TERHADAP
GEJALA POSITIF PADA PASIEN SKIZOFRENIA DR RSJ DR.
RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG PERIODE
JANUARI – DESEMBER 2017**

Putri Annisa Rachmatillah

Abstrak

Skizofrenia merupakan suatu perpecahan pikiran dan dipahami sebagai psikosis yang menahun perjalananya. Peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa yang cukup signifikan membutuhkan penatalaksanaan yang tepat untuk mengatasi gejala-gejala gangguan jiwa yaitu gejala positif dan gejala negatif. Salah satu obat yang sering digunakan dalam terapi tunggal adalah risperidon yang merupakan antipsikotik golongan atipikal atau generasi ke II. Untuk terapi kombinasi obat terbanyak yang digunakan adalah haloperidol dengan klorpromazin karena memiliki efek kerja yang berkaitan satu sama lain. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan efektifitas penggunaan obat antipsikotik tunggal yaitu risperidon dengan kombinasi yaitu haloperidol dan klorpromazin pada gejala positif (gangguan waham, perilaku aneh, persepsi, dan gangguan pikiran) pasien skizofrenia. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional retrospektif dengan menggunakan desain cross sectional. Data yang diobservasi adalah data rekam medik. Hasil analisis uji chi-square menunjukkan bahwa perbandingan efektivitas antipsikotik terapi tunggal risperidon dengan terapi kombinasi haloperidol dan klorpromazin terhadap gejala positif pada pasien skizofrenia akut didapatkan nilai $p= 0,326 (>0,05)$ yang artinya secara statistik tidak bermakna, walaupun hasil univariat menunjukkan efektivitas risperidon lebih unggul.

Kata Kunci : Antipsikotik, Gejala Positif, Haloperidol, Klorpromazin, Risperidon, Skizofrenia

**THE COMPARISON OF EFFECTIVENESS SINGLE
THERAPY RISPERIDON WITH COMBINATION THERAPY
HALOPERIDOL AND CHLORPROMAZINE
ANTIPHYSCHOTIC TO POSITIVE SYMPTOMS IN
SCHIZOPHRENIC AT RSJ DR. RADJIMAN
WEDIODININGRAT LAWANG PERIOD JANUARY –
DECEMBER 2017**

Putri Annisa Rachmatillah

Abstract

Schizophrenia is a split of the mind and is understood as a chronic psychosis of the journey. Significant increase in the number of people with mental disorders requires proper management to overcome the symptoms of mental disorders, namely positive symptoms and negative symptoms. One drug that is often used in single therapy is risperidon which is an atypical or second generation antipsychosis. The most commonly used drug combination therapy is haloperidol with chlorpromazine because it has work effects related to each other. This study aims to determine the difference in the effectiveness of the use of a single antipsychotic drug that is risperidon with a combination of haloperidol and chlorpromazine on positive symptoms (schizophrenic disorder, strange behavior, perception, and mind disorders). This study is a retrospective observational analytic study using cross design sectional. Observed data are medical record data. The result of the chi-square test analysis showed that the comparison of the effectiveness of risperidon single therapy antipsychotic with haloperidol and chlorpromazine combination therapy on positive symptoms in patients with acute combination therapy on positive symptoms in patients with acute schizophrenia obtained $p = 0,326 (> 0,05)$ which means not statistically significant, although the univariate result showed effectiveness risperidon is superior.

Keyword : Antipsychotic, Chlorpromazine, Haloperidol, Risperidon, Positive Symptoms, Schizophrenic