

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan:

- a. Jenis kelamin terbanyak pasien skizofrenia yang mendapat terapi tunggal dan kombinasi adalah laki-laki (70%), kategori usia terbanyak adalah 17-25 tahun (80%), dan status pendidikan terbanyak adalah SD (50%).
- b. Jumlah pasien yang efektif dengan terapi tunggal risperidon adalah 55,8%.
- c. Jumlah pasien yang efektif dengan terapi kombinasi haloperidol dan klorpromazin adalah 44,2%
- d. Tidak ada perbedaan efektivitas antara terapi tunggal risperidon dengan terapi kombinasi haloperidol dan klorpromazin

V.2 Saran

- a. Perlu adanya catatan tilikan PANSS pada rekam medik untuk dapat menilai dan mengevaluasi pasien secara menyeluruh.
- b. Menggunakan metode lain seperti GAF (*Global Assessment Function*) dan PSP (*Personal Social and Performance*) untuk menilai efektivitas terapi. GAF dapat menilai fungsi sosial, pekerjaan, dan psikologis sedangkan PSP (*Personal Social and Performance*) digunakan untuk mengukur performa fungsi pasien skizofrenia.