

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terdapat perbedaan kadar ureum pada bulan ke-0 dengan ke-2 dan bulan ke-2 dengan ke-6.
- b. Terdapat perbedaan kadar kreatinin pada bulan ke-0 dengan ke-2 dan bulan ke-2 dengan ke-6.
- c. Perbedaan paling besar terdapat pada bulan 0-2 dengan kenaikan sebesar 4 mg/dl, sedangkan pada bulan 2-6 hanya 2 mg/dl untuk ureum. Perbedaan pada kreatinin juga paling besar terdapat pada bulan 0-2 dengan kenaikan sebesar 0,06 mg/dl, sedangkan pada bulan 2-6 hanya 0,04 mg/dl.

V.2 Saran

V.2.1 RSUD Budhi Asih

Pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin dilakukan secara rutin pada bulan ke-2 dan ke-6. Hal ini penting untuk mengevaluasi fungsi ginjal pada pasien tuberkulosis.

V.2.2 Peneliti Selanjutnya

Peneliti lain diharapkan dapat mengontrol asupan protein pada pasien tuberkulosis yang mengkonsumsi OAT, sehingga memungkinkan tidak terjadi bias pada penelitiannya tersebut.

V.2.3 Pasien Tuberkulosis Paru

Peningkatan kadar ureum dan kreatinin pada pasien yang mengkonsumsi OAT masih dalam batas normal. Sehingga penggunaan OAT selama 6 bulan dianjurkan untuk dihentikan dan mengikuti perintah dokter.

