

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

- a. Responden dalam penelitian ini mayoritas ibu yang mempunyai bayi yang belum diberikan imunisasi BCG (52,5%).
- b. Responden dalam penelitian ini mayoritas memiliki tingkat pengetahuan sedang (38,4%), sikap cukup baik (39,4%), pendidikan tinggi (54,5%), bekerja (59,6%), layanan kesehatan tersedia baik (52,5%), dan keluarga yang tidak mendukung (57,6%).
- c. Didapatkan hubungan yang bermakna antara pemberian imunisasi BCG pada bayi dengan tingkat pengetahuan ($p=0,000$), sikap ($p=0,000$), pendidikan ($p=0,015$), ketersediaan layanan kesehatan ($p=0,015$), dan dukungan keluarga ($p=0,000$). Tidak didapatkan hubungan bermakna antara pemberian imunisasi BCG pada bayi dengan pekerjaan ($p=0,539$).
- d. Faktor yang paling dominan menentukan pemberian imunisasi BCG pada bayi adalah sikap (OR=6,127), diikuti secara berurutan dengan pendidikan (OR=4,375), tingkat pengetahuan (OR=3,982), dan ketersediaan layanan kesehatan (OR=2,986).

V.2 Saran

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat aktif dalam mencari informasi, mengikuti penyuluhan yang diadakan fasilitas kesehatan tentang bahaya penyakit tuberkulosis dan pentingnya melakukan imunisasi BCG pada bayi.

b. Bagi Puskesmas Cinere

- 1) Diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terutama tentang imunisasi BCG melalui beberapa upaya seperti membantu meningkatkan akses informasi dengan membagikan brosur, memajang

poster, melakukan penyuluhan rutin mengenai imunisasi BCG kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cinere.

- 2) Diharapkan dapat membuat *sticker* yang dapat dibagikan kepada masyarakat yang memiliki bayi sebagai pengingat bagi masyarakat untuk membawa anaknya ke tempat pelayanan kesehatan untuk diberikan imunisasi BCG dengan tujuan preventif sebelum bayi mencapai usia 2 bulan. *Sticker* tersebut dapat ditempel di tempat yang selalu terlihat oleh ibu atau keluarga yang memiliki bayi agar tidak lupa dalam memberikan imunisasi BCG terhadap bayi sebelum batas optimal pemberian imunisasi BCG berakhir. Berikut contoh desain *sticker* yang penulis ciptakan, semoga membantu dan dapat dijadikan referensi dalam pembuatannya.

Gambar desain *sticker* imunisasi BCG dapat dilihat pada gambar 2.

**WASPADA TBC !
RIBUAN JiWA
MELAYANG
KARENA TBC !**

**CEGAH TBC DENGAN
IMUNISASI BCG!**

0-2 MINGGU	2 MGG - 1BLN	1BLN - 2BLN
Tgl Vaksin:	Tgl Vaksin:	Tgl Vaksin:

CP : 085218473898 / IBU ELI (PKM CINERE)

SAYA SUDAH VAKSIN BCG

Gambar 2 Desain *Sticker* Imunisasi BCG

- 3) Diharapkan pula petugas kesehatan Puskesmas Cinere beserta kadernya berperan aktif dalam mengajak ibu dan mempromosikan untuk memberikan imunisasi BCG pada bayi. Pelaksanaan diskusi juga perlu dilakukan oleh petugas kesehatan untuk menentukan teknik yang tepat

untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya ibu dan juga keluarga sehingga diharapkan tidak hanya ibu yang memiliki pengetahuan baik tetapi keluarganya juga memiliki pengetahuan yang baik sehingga keluarga bisa mendukung ibu untuk membawa anaknya ke pelayanan kesehatan guna mendapatkan imunisasi BCG.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Dapat dilakukan penelitian terhadap seluruh faktor risiko dan faktor yang dapat berpengaruh terhadap pemberian imunisasi BCG, seperti jarak ke tempat pelayanan kesehatan, peran petugas kesehatan, serta tradisi.
- 2) Penelitian sebaiknya dilakukan dengan *Focus Group Discussion*, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ibu tidak membawa anaknya untuk dilakukan imunisasi BCG.

