

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Hasil data yang diperoleh dari 85 responden menunjukkan bahwa 21 responden (24,7%) menderita ca colon sigmoid, 11 responden (12,8%) menderita ca colon ascenden, 17 responden (20,1%) menderita ca colon transversum, 17 responden (20,1%) menderita ca colon descenden dan 19 responden (22,3%) menderita ca colon rectum.
- b. Hasil data yang diperoleh dari 85 responden menunjukkan bahwa 19 responden (22,4%) menderita ca stadium I, 22 responden (25,8%) menderita ca stadium II, 28 responden (32,9%) menderita ca stadium III dan 16 responden (18,9%) menderita ca stadium IV.
- c. Hasil data yang diperoleh dari 85 responden menunjukkan bahwa 39 responden (45,8%) tidak merokok dan 46 responden (54,2%) merokok.
- d. Terdapat hubungan antara merokok dengan kejadian kanker kolorektal di RS Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta tahun 2017.

V.2 Saran

V.2.1 Bagi Responden

- a. Agar lebih dapat meningkatkan pengetahuan mengenai ca colon dan menghindari factor risiko ca colon agar dapat mencegah penyakit ca colon.

V.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini dapat dikembangkan menjadi penelitian lanjutan menggunakan desain penelitian lain seperti *case control* atau kohort agar dapat melihat hubungan sebab akibat dan juga bisa meneliti secara langsung hubungan merokok dengan kejadian ca colon.

- b. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk bisa mendapatkan data tentang jenis rokok yang di hisap, jumlah rokok yang di hisap dan kebiasaan merokoknya itu sendiri.

V.2.3 Bagi RSPAD Gatot Soebroto

- a. Disarankan lebih meningkatkan sosialisai tentang ca colon kepada pasien atau pengunjung rumah sakit.

