

HUBUNGAN KEHAMILAN REMAJA, PEMBERIAN MP-ASI DAN RIWAYAT IMUNISASI TERHADAP KEJADIAN STUNTING PADA BADUTA USIA 6-24 BULAN DI WILAYAH PUSKESMAS BOJONGSARI

Suci Permatasary

Abstrak

Stunting adalah salah satu dari beberapa masalah gizi yang terjadi pada anak. Prevalensi *stunting* di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi, hal ini merupakan akibat dari tingginya beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kehamilan pada usia remaja, kesalahan dalam pemberian MPASI pada anak serta riwayat imunisasi yang tidak lengkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kehamilan remaja, pemberian MP-ASI dan riwayat imunisasi terhadap kejadian *stunting* pada baduta usia 6-24 bulan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain *cross-sectional*. Sebanyak 49 responden dipilih menggunakan metode *multiple stages sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner *online* dan data panjang badan menggunakan data hasil pengukuran kader. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat, analisis bivariat dengan uji *chi square* dan *Fisher's Exact*, serta analisis multivariat dengan uji regresi logistik ganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kehamilan remaja ($p=0,039$) dan pemberian MP-ASI ($p=0,010$) dengan kejadian *stunting*. Kehamilan remaja memiliki hubungan paling dominan dengan kejadian *stunting* dengan OR sebesar 6,444.

Kata Kunci : Kehamilan remaja, pemberian MP-ASI, riwayat imunisasi, *stunting*

THE RELATIONSHIP BETWEEN ADOLESCENT PREGNANCY, COMPLEMENTARY FEEDING OF THE BREASTFED AND HISTORY OF IMMUNIZATION WITH THE INCIDENCE OF STUNTING IN INFANTS AGED 6-24 MONTHS IN BOJONGSARI HEALTH CENTER AREA

Suci Permatasary

Abstract

Stunting is one of several nutritional problems that occur in children. The prevalence of stunting in Indonesia still shows a high number and is a result of the high number of factors that affect such as; adolescent's pregnancy, error in complementary feeding of the breastfed and incomplete history of immunization. The purpose of this research was to analyze the relationship between adolescent pregnancy, complementary feeding of the breastfed and immunization history against the incidence of stunting in infants aged 6-24 months. The type of this research was quantitative research with cross-sectional study design. A total of 49 respondents were selected by multiple stages sampling method. Data was collected from online questionnaire and the data length of the body using measurement data of cadres. The data were analyze using univariate analysis, bivariate analysis with chi-square and fisher's exact test and multivariate analysis with multiple logistic regression test. The result of this research showed that there was a relationship between adolescent pregnancy ($p=0,039$) and complementary feeding of the breastfed ($p=0,010$) with the incidence of stunting and the adolescent pregnancy had the most dominant relationship with odds ratio of 6,444.

Key Words : Adolescent pregnancy, complementary feeding of the breastfed, history of immunization, stunting