

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap literatur yang dijadikan data penelitian mengenai DRPs yang terjadi pada pasien PJK didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pasien PJK mengalami minimal satu DRPs.
- b. DRPs yang kemungkinan terjadi pada pasien PJK terdiri dari kategori interaksi antar obat, tidak tepat indikasi, dosis tidak sesuai (*underdose* atau *overdose*), frekuensi konsumsi obat salah, waktu minum obat salah, dan obat tanpa indikasi.
- c. DRPs yang terjadi pada pasien PJK berbeda-beda pada setiap pasien akibat perbedaan karakteristik pasien berupa penyakit penyerta dan obat-obatan yang pasien konsumsi.

V.2 Saran

Saran yang peneliti dapat berikan setelah melakukan analisis dan pembahasan adalah peneliti berharap di masa depan lebih banyak klinisi dan peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut terhadap DRPs yang terjadi pada pasien PJK terutama yang sudah dirawat inap dalam durasi yang cukup lama di RS. Karakteristik dokter sebaiknya juga diteliti untuk mengetahui pengaruh terhadap persepsian yang diberikan pada pasien sehingga mempengaruhi DRPs pada pasien PJK. Dokter harus lebih waspada dan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan pasien karena DRPs bertambah sebanding dengan jumlah obat pada resep. Hal ini bertujuan agar kedepannya dapat ditemukan pengobatan yang paling efektif untuk pasien PJK sehingga dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat PJK.

V.3 Limitasi

Limitasi yang peneliti alami dalam penelitian ini dan perlu diteliti lebih lanjut adalah perbedaan karakteristik dokter, pasien, dan terapi yang diberikan kepada pasien PJK sehingga hasil terapi yang didapatkan pasien tidak selalu sama dan keterbatasan jumlah sampel sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar.