

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

- a. Terdapat hubungan antara multiparitas dengan kejadian letak sungsang.
- b. Tidak terdapat hubungan antara usia ibu berisiko dengan kejadian letak sungsang.
- c. Tidak terdapat hubungan antara riwayat *sectio caesaria* dengan kejadian letak sungsang.
- d. Tidak terdapat hubungan antara plasenta previa dengan kejadian letak sungsang.
- e. Faktor yang memiliki pengaruh terhadap kejadian letak sungsang adalah status multiparitas dengan 3,42 kali apabila di kontrol dengan riwayat *sectio caesaria*.

V.2 Saran

V.2.1 Bagi Subjek

Agar subjek melakukan deteksi dini letak janin khususnya dari usia 32 minggu usia kehamilan sampai dengan persalinan. Subjek juga diharapkan dapat mempertimbangkan jumlah anak untuk mencegah terjadi kejadian letak sungsang pada kehamilan selanjutnya. Metode alternatif posisi lutut-dada (*knee-chest position*) direkomendasikan untuk mencegah kejadian letak sungsang.

V.2.2 Bagi Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto

Rumah sakti dapat memberikan informasi kepada ibu terkait faktor risiko multiparitas dan komplikasi yang akan terjadi dari persalinan letak sungsang dalam bentuk seminar atau penyuluhan.

V.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih jauh mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian letak sungsang. Penambahan

waktu dalam periode penelitian juga disarankan untuk mendapatkan jumlah sampel yang lebih banyak. Peneliti disarankan juga untuk memperluas ruang lingkup dari pengambilan sampel.

