

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari 66 orang pasien *acute kidney injury* yang mengalami COVID-19 di RSPAD Gatot Soebroto, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

- 1) Gambaran karakteristik usia pasien AKI yang mengalami COVID-19 lebih banyak pada usia ≥ 60 tahun, yaitu sebanyak 41 orang (62,1%). Mayoritas pasien berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan, yaitu sebanyak 45 orang (68,2%).
- 2) Stadium *acute kidney injury* didapatkan paling banyak pada stadium 1 dengan jumlah 30 orang (45,5%).
- 3) Tidak didapatkan hubungan yang signifikan antara usia dengan mortalitas pasien COVID-19 dengan nilai $p = 0,161$ ($p > 0,05$).
- 4) Tidak didapatkan hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan mortalitas pasien COVID-19 dengan nilai $p = 0,483$ ($p > 0,05$).
- 5) Hubungan yang signifikan didapatkan antara stadium AKI dengan mortalitas pasien COVID-19 dengan nilai $p = 0,004$ ($p < 0,05$).

V.2 Saran

V.2.1 Bagi RSPAD Gatot Soebroto

- 1) Meningkatkan monitoring terhadap perjalanan penyakit pasien *acute kidney injury* dengan COVID-19 untuk mencegah perjalanan penyakit ke arah yang lebih berat.
- 2) Meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan tata laksana kepada pasien COVID-19 dengan komplikasi.
- 3) Melakukan penyimpanan rekam medis dengan lebih terorganisasi agar lebih mudah dalam pencarian data.

V.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya antara lain:

- 1) Penelitian dilakukan pada populasi yang lebih besar di beberapa rumah sakit di Jakarta ataupun di wilayah lainnya.
- 2) Penelitian terhadap faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kejadian mortalitas pasien COVID-19 dengan *acute kidney injury*.